

RESIN MODIFIED GLASS IONOMER
LUTING CEMENT

INSTRUCTIONS FOR USE

Riva Cem Automix is a self-curing, radiopaque, fluoride releasing paste/paste resin modified glass-ionomer luting material. It is indicated for permanent cementation of metal-based and strengthen-core ceramic restorations and orthodontic Geräte.

Riva Cem Automix comes with the additional light tack cure option for early removal of excess cement and fluoride release for your cementation needs.

Riva Cem Automix is available in a universal light-yellow shade in double barrel syringes. The automix tip attachment offers convenience over traditional hand mixed cement systems.

INDICATIONS FOR USE:

Permanent cementation of:

Indicated material	Type of restorations
PFM	Crowns & bridges
Prefabricated/Cast	Posts
Metals	Crowns, bridges, inlays & onlays, orthodontic appliances & posts
Ceramics (high strength)	Crowns & bridges, inlays & onlays
Ceramics (low strength) ¹	Inlays
Keramik (höhere Festigkeit) ¹	Inlays
Keramik (niedrigere Festigkeit) ²	Inlays

¹High strength ceramics, e.g. Zirconia, Lithium Disilicate

²Low strength ceramics, e.g. Feldspathic Porcelains, Glass Ceramics

CONTRA-INDICATIONS:

1. Pulp capping.
2. Product may cause skin irritations to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention. Any persons having known resin allergies should immediately discontinue use.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. PREPARATION:

- a) Prepare tooth using standard clinical guidelines.
- b) For optimum adhesion, condition the tooth with a mild solution of polyacrylic acid (**Riva Conditioner**, SDI Ltd.). Rinse thoroughly with water and remove excess water.
- c) In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide.

2. MIXING PROCEDURE:

Paste / Paste ratio (ml/ml)	20/1.0
Working time (min, sec) ² (from start of mixing)	1'30"
Excess cement:	5 second per surface
- Tack light cure	1'30" after seating the restoration
- Self-curing gel-phase ²	4'00" after seating the restoration
Setting time (min, sec) ² (after seating the restoration)	5'00"
Temperatur Condition: (26 ± 1°C, 78 ± 1°F)	
Radiopacity	1.5 mm Al

¹ Test conditions: temperature (23 ± 1°C, 73 ± 1°F), relative humidity (50 ± 10%), ISO 9917-2

² These times are approximate only, and may vary based on storage conditions, humidity, age of product and temperature.

- a) Remove the syringe from the foil pack.
- b) Remove the cap from the syringe.
- c) Before each use, dispense a small amount to ensure even dispensing or to remove any dried out paste. Discard this material.

Automixing with SDI Riva Cem Automix tip tip

d) Attach a new mixing tip and secure it by turning it to the right.

e) Dispense and discard a small amount until an evenly mixed paste in a homogenous colour flows out of the tip.

Note: Do not expose **Riva Cem Automix** paste directly to operatory light to avoid early setting of the material.

Handmixing with a spatula

d) Extrude required amount of pastes onto a mixing pad.

e) Mix the two pastes together thoroughly in the middle of the plunger to obtain the correct dispensing ratio of the two pastes.

f) Using a spatula, mix the two pastes together thoroughly for 15 seconds.

Be careful not to incorporate air bubbles.

Note: Do not expose **Riva Cem Automix** paste directly to operatory light to avoid early setting of the material.

3. CEMENTATION PROCEDURE:

- a) Ensure the internal surface of the restoration to be seated is cleaned, dried and prepared according to manufacturer's instructions.
- b) Apply a thin layer of cement to the bonding surface.

c) Seat the restoration within 30 seconds of completion of mixing before any light curing is carried out.

Note: Avoid overfilling crowns.

2. Room temperatures above 23°C/73°F will reduce the working time.

Light tack cure any excess material for 5 seconds per surface using a high power LED curing light (460-480nm emission Radii-Cal, Radii Plus, Radii Xpert, SDI Ltd.).

Excessive excess material using a scalpel or explorer.

Note: Excessive excess material can also be removed using self-curing gel stage (when cement feels rubbery), after 1 min 30 seconds.

f) Maintain isolation for at least 5 min after seating of restoration.

STORAGE AND HANDLING:

- Avoid excess heat and direct sunlight.

- Store between 2°C and 25°C (35° - 77°F).

- Use at room temperature between 20°C and 25°C (68° - 77°F).

- If used at cooler temperature allow product to reach room temperature prior to use.

- Do not remove Riva Cem Automix syringes from foil packets until ready to use.

- For best results, use a new mixing tip. To store and avoid cross-contamination, discard the mixing tip and replace with original sealing cap securely attached to the syringe. Do not allow the pastes to dry out.

PRECAUTIONS:

- For professional use only.

- Do not take internally.

- Do not use after expiry date.

- Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

- SDB available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

FIRST AID:

- Eye (kontakt): Wash thoroughly with water and seek medical attention.

- Skin (kontakt): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol.

- Inhalation: Breathing: Dieses Produkt ist nur über den Zahnarzt oder den Fachhandel zu beziehen.

- Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.

- Inhalation: No symptoms expected.

SHADE:

- Light Yellow

VORSICHTSMASSENNAHMEN:

- Nicht einnehmen.

- Nach dem Verlustdatum nicht mehr verwenden.

- Beachten: Dieses Produkt ist nur über den Zahnarzt oder den Fachhandel zu beziehen.

- SDB erhältlich unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem regionalen Repräsentanten.

ERSTE HILFE:

- Augen (Kontakt): Gründlich mit Wasser spülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

- Haut (Kontakt): Mit einem mit Alkohol getränkten Tuch oder Schwamm entfernen. Gründlich mit Wasser spülen.

- Verschlucken: Viel Wasser/Milch trinken. Bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

- Einatmen: Keine Symptome zu erwarten.

PRIMEROS SOCORROS:

- Ojos (contacto): Lave bien con agua y procure asistencia médica.

- Piel (contacto): Remova com um pano ou esponja imbebido em álcool.

- Ingestão: Beba bastante água/leite. Procure atendimento médico se os sintomas persistirem.

- Inalação: Nenhum sintoma é esperado.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Contacto con los ojos: Lave la zona abundantemente con agua y busque atención médica.

- Contacto con la piel: Utilice una esponja o trapo humedecido en alcohol. Lave abundantemente con agua.

- Ingestión: Beba agua o leche en abundancia. Busque atención médica si los síntomas persisten.

- Inhalación: No se esperan síntomas.

TONO:

- Amarillo claro

Made in Australia by SDI Limited

3-15 Brundson Street,
Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 0800 0225 574

Brazil 0800 770 1735

France 0800 0225 574

Germany 0800 1005759

Italy 0800 0225 574

Spain 0800 0225 574

United Kingdom 0800 0225 574

USA & Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH

Hansestrasse 85

51149 Cologne

Germany

T+49 2203 9255 0

PAK4130 B

CE 0297

25°C 77°F

2°C 35°F

KUNSTSTOFFMODIFIZIERTER
GLASIONOMERBEFESTIGUNGSEZIMENT

GEBRAUCHSANWEISUNG

Riva Cem Automix is ein selbsthärtender, röntgenopak, Fluorid freisetzend, kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungseziment im Paste/Paste-System. Er ist indiziert zur definitiven Zementierung metallbasierter und vollkeramischer Restaurationen sowie orthodontischen Geräten.

Riva Cem Automix kommt mit der zusätzlichen Light-Tack Cure Option für die frühe Entfernung von überschüssigem Zement und Fluorid.

Riva Cem Automix ist in Universal light-yellow Shade in Doppelkammerflaschen erhältlich. Das Automix Aufsatz ist das System praktischer als herkömmliche Mischungsmethoden.

INDICATIONS FOR USE:

Permanent cementation of:

Indicated material	Type of restorations
PFM	Crowns & bridges
Prefabricated/Cast	Posts
Metals	Crowns, bridges, inlays & onlays, orthodontic appliances & posts
Ceramics (high strength)	Crowns & bridges, inlays & onlays
Ceramics (low strength) ¹	Inlays
Keramik (höhere Festigkeit) ¹	Inlays
Keramik (niedrigere Festigkeit) ²	Inlays

¹High strength ceramics, e.g. Zirconia, Lithium Disilicate

²Low strength ceramics, e.g. Feldspathic Porcelains, Glass Ceramics

CONTRA-INDICATIONS:

1. Pulp capping.
2. Product may cause skin irritations to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention. Any persons having known resin allergies should immediately discontinue use.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. PREPARATION:

- a) Prepare tooth using standard clinical guidelines.
- b) For optimum adhesion, condition the tooth with a mild solution of polyacrylic acid (**Riva Conditioner**, SDI Ltd.). Rinse thoroughly with water and remove excess water.
- c) In cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide.

2. MIXING PROCEDURE:

Paste / Paste ratio (ml/ml)	20/1.0

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols

RIVA CEM AUTOMIX

NLD

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

DAN

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

GRC

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

TUR

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

CZE

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

SWE

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

KOR

HARS GEMODIFICEERD GLAS
IONOMEER BEVESTIGINGSCMENT

GEBRUIKSGELEIDING

Riva Cem Automix is een selfhardend, radiopak, fluoride-afgewend, met hars gemodificeerd glasmonomer bevestigingsmateriaal. Het wordt gebruikt voor het permanent cementeren van op metaal gebaseerde en keramische restaureringen en orthodontische apparaten.

Riva Cem Automix wordt geleverd met de extra uithardingsoptie met licht voor vroegeindige verwijdering van overliggend cement, fluoride-afgifte voor cementering behoeft niet te wachten tot de volledige uitharding.

Riva Cem Automix is verkrijbaar in een universele lichtgele tint in een dubbelspuit systeem. Het mengpunt-hulpstuk van de automix is eenvoudiger in gebruik dan de hand gemengde cementsystemen.

INDICATIES VOOR GEBRUIK:

Permanent cementering van:

Gedureerde materiaal	Type restauraties
PFM	Kronen & bruggen
Geprefabriceerd/gegoten	Stiften
Metalen	Kronen, bruggen, inlays & onlays, orthodontische apparaten & stifters
Keramiek (hoge sterke)	Kronen & bruggen, inlays & onlays
Keramiek (lage sterke)	Inlays

* Keramiek met hoge sterke, feks zirconiumoxide, lithiumdisilicat

* Keramiek met lage sterke, bijv. veldspaatporselein, glaskeramiek

CONTRA-INDICATIES:
1. Pulpal-overkapping
2. Het product kan bij sommige mensen huidirritaties veroorzaken. In de gevallen stoppen met het gebruik en medische hulp inroepen.
Mensen met een bekende harsallergie moet het gebruik onmiddellijk stoppen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. VOORBEREIDING:
a) Prepareer de tand volgens standaard klinische richtlijnen.
b) Gebruik een optrale houder die tanden conditioneren met een milde oplossing in polyacrylyl (Riva Conditioner, SDI Ltd.). Grondig afspoelen met water en overliggend water verwijderen.
c) Als pulpabescherming nodig is, gebruik dan een calciumhydroxide.

2. MENGPROCEDURE:
Pasta / Pastaverhouding (ml/ml) 2/0.10
Gebruiktijd (min, sec)¹⁾ (vanaf het begin van het mengen) 1'30"

Overslag cement:
- Uitharding met licht
- Zelfhardende gefase²⁾
5 seconden per oppervlakte 1'30" na het plaatzen van de restauratie
Ved bindeveelhedenhärting
- Zelfhardende gefase²⁾

Uithardingsstijd (min, sec)²⁾ (na het plaatsen van de restauratie) 5'00"
Temperatuurconditie: (26 ± 1°C, 78 ± 1°F)
Radiopaciteit: 1,5 mm Al

1 Testomstandigheden: temperatuur (23 ± 1°C, 73 ± 1°F), relatieve vochtigheid (50 ± 10%). ISO 9917-2
2 Deze tijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van oplagomstandigheden, vochtigheid, leeftijd van het product en temperatuur.

a) Haal de spuit uit de folieverpakking.
b) Verwijder de dop van de spuit.
c) Voor gebruik een kleine hoeveelheid spuiten om een gelijkmatige afgifte te garanderen of om eventuele uitgedroogde pasta te verwijderen. Gooi dit overigeleke weg.

Autometrisch mengen met SDI Riva Cem Automix mengpunt
Doe een nieuwe mengpunt. Deze vastzetten door naar rechts te draaien.
e) Spuit eerst een kleine hoeveelheid totdat een gelijkmatig mengende pasta in een homogene kleur uit de punt stroomt.

Opmerking: De mengpunt is voor eenmalig gebruik. Gooi de gebruikte mengpunt weg als de originele spuitdop op de spuit. De spuit moet worden bewaard met de dop.

Met de hand mengen met een spatel:
d) Spuit de benodigde hoeveelheid pasta's in een mengkom.

Belangrijk: de suim stevig in het midden van de zuiger plaatsen om de juiste dosering verhogen van de twee pasta's te verkrijgen.

e) Maak de suim stevig in het midden van de zuiger en laat de suim 15 seconden drogen door elkaar. Voorkom dat er luchtbelletjes in komen.

Opmerking: Stel **Riva Cem Automix-pasta** niet rechtstreeks bloot aan operatief om vroegeindige uitharding van het materiaal te voorkomen.

3. CEMENTATIE-PROCEDURE:
a) Sorg voor dat het benennopervlak van de restauratie die moet worden geplaatst, gereinigd en gedroogd is en voorbereid volgens de instructies van de fabrikant.

b) Breng een dunne laag cement aan op het hechtopervlak.

c) Plaats de restauratie binnen 30 seconden na het mengen voor de uitharding met licht wordt uitgevoerd.

Opmerking: de suim moet van 20°C tot 25°C zijn.

d) Kamer Temperatuur: boven 23°C/73°F verkoren de werklijn.

e) Overtalig materiaal 5 seconden per oppervlakte uitharden met een high power LED-uthardingslamp (460-480 nm emissie Radii-Cal, Radii Plus, Radii Xpert, SDI Ltd.).

f) Verwijder overliggend materiaal voorzichtig met een scalpel of verkenner. Bemerk: Overliggende materiaal kan oogs fijnes jerners achterlaten.

g) Druk de isolatie gedurende ten minste 5 min na plaatsing van de restauratie.

OPSLAG EN GEBRUIK:

- Haal de Riva Cem Automix-spuitens uit de folieverpakkingen wanneer ze gebruikt moeten worden.

- Bewaren tussen 2°C en 25°C (35 - 77°F).

- Laat het product op kamertemperatuur komen als het bewaard werd bij lagere temperaturen.

- Gebruik bij kamertemperatuur tussen 20°C en 25°C (68 - 77°F).

- Bewaren met de dop stevig op de spuit bevestigd. Laat de pasta's niet uitdrogen.

VOORZORGSMATREGEN:

- Alleen voor professionele gebruik.

- Niet gebruiken op de vervaldatum.

- Let op volgens de federale wetgeving mag dit apparaat alleen worden verkocht door of opdracht van een tandarts.

- SDS beschikbaar op www.sdi.com.au of neem contact op met uw regionale vertegenwoordiger.

ERSTE HULP:

- **Oog (contact):** Grondig spoelen met water en medische hulp inroepen.

- **Hud (contact):** Verwijderen met een alcohol gedrevene doek of spons. Grondig spoelen met water.

- **Inname:** Drink veel water/melk. Zoek medische hulp als symptomen aanhouden.

- **Inademing:** Geen symptomen verwacht.

KLEUR:

- Lichtgeel

RIVA CEM AUTOMIX

DAN

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

GRC

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

TUR

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

CZE

SDI

RIVA CEM AUTOMIX

SWE

HARPIKS MODIFICEERT GLAS
IONOMERT ATENINGSCEMENT

BRUGSANVINDING

Riva Cem Automix is een selfhardend, radiopak, fluoride-afgewend, met hars gemodificeerd glasmonomer bevestigingsmateriaal. Het wordt gebruikt voor het permanent cementeren van op metaal gebaseerde en keramische restaureringen en orthodontische apparaten.

Riva Cem Automix wordt geleverd met de extra uithardingsoptie met licht voor vroegeindige verwijdering van overliggend cement, fluoride-afgifte voor cementering behoeft niet te wachten tot de volledige uitharding.

Riva Cem Automix is verkrijbaar in een universele lichtgele tint in een dubbelspuit systeem. Het mengpunt-hulpstuk van de automix is eenvoudiger in gebruik dan de hand gemengde cementsystemen.

INDICATIE FOR BRUG:
Permanent cementering van:

Gedureerde materiaal	Type restauraties
PFM	Kronen & bruggen
Geprefabriceerd/gegoten	Stiften
Metalen	Kronen, bruggen, inlays & onlays, orthodontische apparaten & stifters
Keramiek (hoge sterke)*	Kronen & bruggen, inlays & onlays
Keramiek (lage sterke)*	Inlays

* Keramiek met hoge sterke, feks zirconiumoxide, lithiumdisilicat

* Keramiek met lage sterke, bijv. veldspaatporselein, glaskeramiek

CONTRA-INDICATIES:
1. Pulpal-overkapping

2. Het product kan bij sommige mensen huidirritaties veroorzaken. In de gevallen stoppen met het gebruik en medische hulp inroepen.
Mensen met een bekende harsallergie moet het gebruik onmiddellijk stoppen.

BRUGSANVINDING:
1. **FORBEREDELSE:**

a) Klargør tanden ved hjælp af kliniske standardretningslinjer.
b) Optimal vedhæftning conditioneres tandem med en mild oplosning af polyacrylyl (Riva Conditioner, SDI Ltd.). Skål grundigt med vand, og flytter tilbage vand.

c) I tilfælde, hvor pulpabeskyttelse er nødvendigt, skal der anvendes calciumhydroxid.

2. MENGPROCEDURE:

Pasta / Pasta orhan (ml/ml) 2/0.10

Gebruiktijd (min, sec)¹⁾ (vanaf het begin van het mengen) 1'30"

Overslag cement:
- Bindveelhedenhärting
- Zelfhardende gefase²⁾
5 seconden per oppervlakte 1'30" na het plaatzen van de restauratie
Ved bindeveelhedenhärting
- Zelfhardende gefase²⁾

Uithardingsstijd (min, sec)²⁾ (na het plaatsen van de restauratie) 5'00"
Temperatuurconditie: (26 ± 1°C, 78 ± 1°F)

Radiopaciteit: 1,5 mm Al

1 Testomstandigheden: temperatuur (23 ± 1°C, 73 ± 1°F), relatieve vochtigheid (50 ± 10%). ISO 9917-2
2 Deze tijden zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van oplagomstandigheden, vochtigheid, leeftijd van het product en temperatuur.

a) Tag sprut uit de folieverpakking.
b) Tag hæften af spretten.

c) Dispenser en kleine hoeveelheid spuiten om een gelijkmatige afgifte te garanderen of om eventuele uitgedroogde pasta te verwijderen. Gooi dit overigeleke weg.

Autometrisch mengen met SDI Riva Cem Automix-products blandingsspids:
Doe een nieuwe mengpunt. Deze vastzetten door naar rechts te draaien.

d) Dispenser en kleine hoeveelheid spuit, indtil den kommer en vænt.

e) Sæt Radii Xpert i en fast position af spredsen.

Bemærk: Blandingsspidsen i kun til engangbrug. Kasser den brugte blandingsspids og arbring den originale hætte på spretten. Spretten skal opbevares sammen med hætten.

Blanding i hånden med en spatel:
d) Pres den benodigde hoeveelheid pasta ud på en blandeglade.

e) For at komme tilbage til den forresten af, at det ikke er nødvendigt for at få et godt resultat.

Autometrisch mengen met SDI Riva Cem Automix-products blandingsspids:
d) Sæt en ny blandingsspids på, og fastgør den ved at dreje den til den højre.

e) Dispenser og kællér en lille mængde, indtil den kommer en vænt.

Bemærk: Blandingsspidsen i kun til engangbrug. Kasser den brugte blandingsspids og arbring den originale hætte på spretten.

Autometrisch mengen met SDI Riva Cem Automix-products blandingsspids:
d) Sæt en ny blandingsspids på, og fastgør den ved at dreje den til den højre.

Bemærk: Blandingsspidsen i kun til engangbrug. Kasser den brugte blandingsspids og arbring den originale hætte på spretten.

</

SDI **RIVA CEM AUTOMIX** **BUL**

ГЛАС-ЙОНОМЕРЕН ЦИМЕНТ МОДИФИЦИРАН
СВС СМОЛЯ ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Riva Cem Automix е самополимеризиращ, рентгеноконгресен, флуорополимеризираща паста / паста, модифицирана със смола глас-йономерен цимент за циментиране. Препоръка се за постоянно фиксиране на метални и подпилни керамични конструкции, и ортодонтични импланти.

Riva Cem Automix се предлага с допълнителна опция за леко втвърдяване при температура от 20°C до 25°C (68-77°F) на 100% възможност, използвайки филтер, който винаги нужда е от използване.

Riva Cem Automix наличен в унитарен светло-жълт цвят в двойчина. **Riva Cem Automix** еднакъв с циментирани импланти и предлага удобство в сравнение с традиционните ръчно смесвани с циментови системи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Постоянно циментиране на:

Вид материал	Вид реставрации
PFM	Корони & мостове
Пинели	Щифтове
Метали	Корони, мостове, инлай & онлай, ортодонтични приложения & щифтове
Керамики / поддиспени/	Корони & мостове, инлай & онлай
Керамики / неподдиспени/	Инлай

1 Поддиспени керамики, напр. цирконий, липинг дисплакат и др.
2 Неподдиспени керамики, напр. фенодентални корпелани, стъклена керамика

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Покритие на пулпита
- Продуктът може да причини кожни раздразнения при някои хора. В такива случаи, пристапете към производителя и постъпете медицинска помощ. Винаги има, които имат известни алергии към смола, тръбва незадържано да спрат употребата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- 1. ПОДГТОВКА:**
 - Подгответе зъба, като използвате стандартни клинични указания.
 - За оптимална адекватност, коронирайте зъба с месец разтвор на поликавол (Riva Conditioner, SDI Ltd.). Испакнете обично с вода и отстранете излишното количество.
 - В случаите, когато е необходима защита на пулпата, използвайте капачка хидроксид.
- 2. ПРОЦЕДУРА НА ОТСТРАНЕНИЕ:**

Съотношение паста/паста (ml/ml)	2.0/1.0
Време за работа (мин, сек) ² (от началото на смесването)	130"
Изменен циментирани със самополимеризираща се ген-фаза ³	5 секунд за повърхност, 130" след поставяне на реставрацията
Време за втвърдяване (мин, сек) ⁴ (след съставяне на реставрацията)	5'00"
Рентгеноконгрес	1.5 mm Al

1 Условия при тестуване: температура (23 ± 1°C, 73 ± 1°F), относителна влажност (50 ± 10%). ISO 9917-2
2 Тези времена са само приблизителни и може да варират в зависимост от условията на съхранение, влажност, дата на производство на продукта и температура.
3 Издадете спринцовката от опаковката.
4 Отстранете капачката от спринцовката.

3. АДДЕТИВНО СМЕСВАНЕ С НАКРИЙКА ЗА СМЕСВАНЕ на SDI Riva Cem Automix:
a) Използвайте нова накрийка за смесване и го закрепете, като го завъртите надолу.
b) Разпределете и извършете малко количество, докато от възраста изчезне във временно смесена паста с хомогенен цвят.
c) Накрийката за смесване е само за единкратна употреба. Изхвърлете якото материали.

4. АДДЕТИВНО СМЕСВАНЕ С НАКРИЙКА ЗА СМЕСВАНЕ на SDI Riva Cem Automix:
a) Използвайте нова накрийка за смесване и го закрепете, като го завъртите надолу.
b) Разпределете и извършете малко количество, докато от възраста изчезне във временно смесена паста с хомогенен цвят.
c) Накрийката за смесване е само за единкратна употреба. Изхвърлете якото материали.

5. РЪЧНО СМЕСВАНЕ:
a) Използвайте същото количество паста върху подложка за смесване. Винаги уверете се, че пампетът е почистван стабилно в средата на буталото, за да получите правилното съотношение на дозиране на паста.

6. ЗАБЕДИТЕЛСТВО:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка, за да избегнете ръчно втвърдяване на материала.

7. ПРИГОДА НА ДЛЯКА:
a) Уверете се, че всички части на реставрацията, които ще се поставят, са почистени и са подгответи според инструкциите на производителя.

8. НАДЕЖДА:
a) Надеждата е търговска имета на скапер и скапер-бръшлян.

9. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка, за да избегнете ръчно втвърдяване на материала.

10. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МЕРКИ:
a) Не изваждайте спринцовката от опаковката, ако не сте готови да я използвате.

11. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Ако се съхранява при по-ниска температура, оставете продукта да достигне стапна температура преди употреба.

12. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

13. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

14. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

15. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

16. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

17. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

18. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

19. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

20. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

21. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

22. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

23. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

24. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

25. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

26. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

27. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

28. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

29. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

30. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

31. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

32. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

33. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

34. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

35. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

36. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

37. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

38. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

39. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

40. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

41. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

42. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

43. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

44. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

45. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

46. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

47. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

48. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

49. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

50. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

51. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

52. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

53. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

54. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

55. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

56. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

57. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

58. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

59. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

60. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

61. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

62. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

63. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

64. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

65. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

66. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

67. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

68. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

69. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

70. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

71. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

72. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

73. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

74. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

75. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

76. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

77. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

78. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

79. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

80. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

81. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

82. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

83. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

84. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

85. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

86. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

87. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

88. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

89. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

90. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

91. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

92. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

93. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

94. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

95. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

96. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

97. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

98. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

99. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

100. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

101. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

102. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

103. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

104. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

105. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

106. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

107. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

108. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

109. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

110. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

111. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

112. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

113. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

114. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

115. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

116. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

117. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

118. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

119. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

120. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

121. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

122. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

123. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

124. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

125. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте паста Riva Cem Automix директно на работна съставка.

126. СЪХРАНЕНИЕ:
a) Използвайте п