SDI POLA OFFICE+

ENG IN OFFICE TOOTH COLOUR RESTORATION SYSTEM
BUL СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЕТА НА ЗЪБИТЕ В ОФИСА
CES SYSTÉM PRO OBNOVU BARVY ZUBNÍ SKLOVINY V ORDINACI
DAN SYSTEM TIL GENOPRETNING AF TANDFARVE PÅ KONTORET
DEU PRAXISSYSTEM FÜR DIE RESTAURATION DER ZAHNFARBE
ELL ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
FIN VASTAANOTOLLA KÄYTETTÄVÄ HAMPAAN VÄRIN PALAUTUS-JÄRJESTELMÄ
FRA SYSTÈME EN CLINIQUE DE RESTAURATION DE LA COULEUR DES DENTS
HUN RENDELŐI FOGSZÍN-HELYREÁLLÍTÓ RENDSZER
KOR 치과에서 시술하는 치아 미백 장비
ITA SISTEMA DI RIPRISTINO DEL COLORE DENTALE IN STUDIO
LIT DANTŲ SPALVOS ATSTATYMO SISTEMA KLINIKOJE
NOR SYSTEM FOR RESTAURERING AV TANNFARGE PÅ KONTORET
POL SYSTEM ODTWARZANIA KOLORU ZĘBÓW W GABINECIE
POR SISTEMA DE RESTAURAÇÃO DA COR DENTÁRIA EM CONSULTÓRIO
RON SISTEM DE RESTAURARE A CULORII DINTILOR ÎN CABINET
RUS СИСТЕМА АМБУЛАТОРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА ЗУБОВ
SPA SISTEMA DE RESTAURACIÓN DEL COLOR DE LOS DIENTES EN LA CONSULTA
SWE SYSTEM FÖR ÅTERSTÄLLNING AV TANDFÄRG I PRAKTIKEN

SDI Limited, 3-15 Brunsdon Street, Bayswater Victoria 3153, Australia

Austria 00800 0225 5734
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734

Last Revised: 08-2025

PAK41446 A

EU REP SDI Germany GmbH Hansestrasse 85 51149 Cologne, Germany T: +49 2203 9255 0

0297 MD

Allergies & Pifferanten

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE
Pola Office+ is designed to restore the natural tooth colour of intrinsically discoloured vital and non-vital teeth. This procedure should only be performed by a dental professional in a controlled environment, due to the challenges of access and limitations in patient compliance.
Pola Office+ is a hydrogen peroxide based in-office tooth colour restoration system requiring minimal chair time. It is a neutral pH gel and contains Potassium Nitrate to maximise patient comfort. The dual-barrel syringe system mixes the gel so it can be readily and precisely applied directly on to the tooth area to be treated.

COMPOSITION:
AQUA, HYDROGEN PEROXIDE, PVP, SODIUM HYDROXIDE, ETIDRONIC ACID, POTASSIUM NITRATE, SODIUM STANNATE, CI77007

37.5% HP clear gel
30.4% HP mixed gel

INDICATIONS FOR USE:
- Pola Office+ is used for the controlled, medically indicated restoration of the natural tooth colour of discoloured, vital and non-vital teeth that cannot be restored to a natural or normal tooth colour by professional means.
- Medical natural tooth colour restoration is indicated when discolouration due to a pathologically developing tooth colour leads to a deterioration in the health-related quality of life of the patient. Medical natural tooth colour restoration can also be used as an alternative to significantly more invasive cosmetic or prophetic treatments of the affected teeth (fillings, crowns, veneers) and should therefore always be the first choice.
- Examples of causes of such intrinsic discoloration are:
  - Tetracycline/minocycline discoloration, mild to severe dental fluorosis, non-vital teeth (pulp necrosis) – e.g. due to trauma, genetic or age-related degenerative discoloration, porphyria or jaundice, heavy deposits of food colouring with penetration into the tooth substance (intrinsic discoloration due to extrinsic dyes). It can be used to assist in restoring the natural tooth colour of individual or multiple teeth and endodontically treated, non-vital teeth including intracoronal treatment.

IMPORTANT:
Before treatment, a diagnostically confirmed indication for "medically indicated restoration of the natural tooth colour " must be made by the dentist.

CONTRA-INDICATIONS:
- Do not use on pregnant or lactating women.
- Do not use on children under 18 years of age.
- Do not use the Gingival Barrier (SDI Limited) on any persons having known contact resin/acrylic allergies.

DO NOT USE:
- Do not use Pola Office+ on any persons having known peroxides allergies.
- Do not use on patients with extremely sensitive teeth.

SIDE EFFECTS:
- Possible transient tooth sensitivity, for vital teeth only. Ensure patient is pre-warned before treatment and provide instructions for post treatment care if needed.
- Possible transient soft tissue irritation if the Gingival Barrier is not applied correctly to prevent product from contacting the soft tissue.
- The components of SDI Gingival Barrier could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Gingival Barrier should not be used. Some patients may experience soft tissue swelling, redness, tendemess. These side effects are generally temporary and is important patients are aware of them and clinicians to monitor for these potential reactions and appropriately manage with a medical expert.

INTERACTIONS:
None known.
If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of this product and to the competent authority in your state or country.

TIPS FOR COLOUR RESTORATION: VITAL TOOTH
1. Select appropriate candidate. Note: Not everyone is suitable for in-office tinting using Pola Office+ with translucent teeth or in the Vita® C group.
2. Patient must have good overall health.
3. Seal all exposed roots and restorations.
4. Inform patient that results are not guaranteed as the removal of stains varies between patients.
5. Acid etching before treatment is NOT recommended.
6. Large diameter suction tips are not recommended as they can spread the gel to other areas.
7. Mild discomfort in teeth during treatment can be a common side effect.
8. If patient experiences sensitivity during light curing, move the tip slightly away from the tooth. If this doesn't work, remove gel and rinse the affected area. Assess other possible causes.
9. Delay any aesthetic restorations for 2 to 4 weeks after treatment.
10. Advise patient not to smoke, consume highly coloured, hot or cold foods or beverages for at least 2 days.
11. Treat any post-operative sensitivity with a desensitising gel or toothpaste.

INSTRUCTIONS FOR COLOUR RESTORATION: VITAL TOOTH
Recommendations :
1. Select appropriate candidate. Note: Not everyone is suitable for in-office tinting using Pola Office+ with translucent teeth or in the Vita® C group.
2. Patient must have good overall health.
3. Seal all exposed roots and restorations.
4. Inform patient that results are not guaranteed as the removal of stains varies between patients.
5. Acid etching before treatment is NOT recommended.
6. Large diameter suction tips are not recommended as they can spread the gel to other areas.
7. Mild discomfort in teeth during treatment can be a common side effect.
8. If patient experiences sensitivity during light curing, move the tip slightly away from the tooth. If this doesn't work, remove gel and rinse the affected area. Assess other possible causes.
9. Delay any aesthetic restorations for 2 to 4 weeks after treatment.
10. Advise patient not to smoke, consume highly coloured, hot or cold foods or beverages for at least 2 days.
11. Treat any post-operative sensitivity with a desensitising gel or toothpaste.

IMPORTANT:
Before treatment, a diagnostically confirmed indication for "medically indicated restoration of the natural tooth colour " must be made by the dentist.

CONTRA-INDICATIONS:
- Do not use on pregnant or lactating women.
- Do not use on children under 18 years of age.
- Do not use the Gingival Barrier (SDI Limited) on any persons having known contact resin/acrylic allergies.

DO NOT USE:
- Do not use Pola Office+ on any persons having known peroxides allergies.
- Do not use on patients with extremely sensitive teeth.

SIDE EFFECTS:
- Possible transient tooth sensitivity, for vital teeth only. Ensure patient is pre-warned before treatment and provide instructions for post treatment care if needed.
- Possible transient soft tissue irritation if the Gingival Barrier is not applied correctly to prevent product from contacting the soft tissue.
- The components of SDI Gingival Barrier could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Gingival Barrier should not be used. Some patients may experience soft tissue swelling, redness, tendemess. These side effects are generally temporary and is important patients are aware of them and clinicians to monitor for these potential reactions and appropriately manage with a medical expert.

INTERACTIONS:
None known.
If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of this product and to the competent authority in your state or country.

TIPS FOR COLOUR RESTORATION: NON VITAL TOOTH
Recommendations :
1. Isolate tooth effectively employing standard techniques and instruments.
2. Protect oral mucosa to prevent chemical burns employing standard techniques and instruments.
3. Verify adequate endodontic obturation.
4. Use protective barrier according to the manufacturer's instructions to prevent peroxide from reaching the pulp canal through the root.
5. Avoid acid etching as periodontal ligament irritation may result.
6. Advise the patient that a brightened non-vital tooth will not look the same as a vital tooth.
7. Recall patients periodically to examine the brightened teeth (clinically & radiographically).

INSTRUCTIONS FOR COLOUR RESTORATION: NON VITAL TOOTH
Recommendations :
1. Determine and record pre-operative shade. Please follow this Vita® shade guide arrangement according to degree of brightness: B1►A1►B2►D2►A2►C1►C2►D4►A3►D3►B3►A3.5►B4►C3►A4►C4
2. Isolate tooth/teeth undergoing brightening using a rubber dam, employing standard techniques and instruments. Ensure the dam fits tightly at the cervical margin. Note: If a rubber dam is not used, cover approximately half of the adjacent vital teeth with 3-4mm thick layer of Gingival Barrier (SDI Limited) to insulate from heat and discomfort of the curing light. This is done when one tooth is being bleached and non-vital.
3. Open lingual access to pulp chamber and remove all composite, base material and gutta percha 2-3 mm apical to the CE junction. Place a glass ionomer/zinc phosphate base (Riva Light Cure or Riva Self Cure (SDI Limited)), at least 1 mm thick to ensure a barrier between the "sealed" root canal and brightening gel.
4. Place the Pola Office+ gel into the opened pulp chamber and onto the labial surface.
5. Leave gel on/in for 8 min (Optional: A curing light may be used at this stage, see Radii range (SDI Limited)).
NOTE: If using a curing light and treating inner and outer surfaces, 2 curing lights can be used (one on each side of tooth) to activate Pola Office+.
6. Suction off the gel employing standard techniques and instruments.
7. Repeat Step 4-6 until desired shade is achieved.
8. After the last application, suction and wash the gel off employing standard techniques and instruments.
9. Record the final shade.

Additional notes:
Gingival Barrier syringe tips are for single use only.
Take extra care in patient cross contamination.

STORAGE AND HANDLING
Store product in the refrigerator (2°-8°C / 35°-46°F)
Use product at room temperature.
Do not use the Gingival Barrier (SDI Limited) on any persons having known contact resin/acrylic allergies.

PRECAUTIONS
- For professional use only.
- Do not remove syringe from refrigerator until ready to use - Pola Office+ is heat and light sensitive. Keep out of reach of children and pets.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not use if the foil appears to be bloated.
- Pola Office+ syringes may be used until expiry - remove cap and attach nozzle with caution.
- Patient must wear protective eyewear.
- Operators must wear gloves, mask and protective eyewear.
- Anyone with a history of chemical allergies is advised to undergo allergy testing before treatment.
- Do NOT anaesthetise patient.
- Do not allow Pola Office+ gel to come in contact with skin, eyes and soft tissues.

If another brand of gingival barrier/ resin dam other than SDI's is used, please ensure you follow all precautions listed by the manufacturer.

FIRST AID
Eye (contact): Open the eye wide and thoroughly wash for 15 minutes with running water. Seek medical attention.
Skin (contact): Immediately wash thoroughly with water.
Apply a slurry of sodium bicarbonate and water to the affected area. Seek medical attention if symptom persists.
Ingestion: Rinse mouth with water. Gargle with salt water and drink lots of milk. Seek medical attention if symptoms persist.
Inhalation: No symptoms expected under normal conditions of use. If affected, move to well ventilated area. If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of this product and to the competent authority in your state or country.

Dispose in accordance with local regulations.
SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

Vita shade guide is a trademark of VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germany

PACKAGING:
3 Patient Kit
3 x 2.8mL Pola Office+ syringes
3 x 1g gingival barrier syringes

1 Patient Kit
1 x 2.8mL Pola Office+ syringes
1 x 1g gingival barrier syringes

BUL ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Pola Office+ е предназначен да възстанови естествения цвят на зъбите в кабинет при пациенти с витални и невитални зъби. Таз процедура трябва да бъде извършена единствено от зъболекар в контролирана среда, поради предизвикателства относно достъпа и ограниченията на пациента.
Pola Office+ е система на базата на водороден пероксид за възстановяване на цвета на зъбите в кабинета, изискваща минимално време на престой.
Това е гел с неутрално pH и съдържа Калиев нитрат за максимизиране на комфорта на пациента. Системата от спринцовка с двоен цилиндър смесва гела, така че той да може да бъде лесно и прецизно нанесен директно върху областта на зъба, която ще се третира.

СЪСТАВ:
ВОДА, ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, PVP, НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ЕТИДРОНОВА-Н КИСЕЛИНА, КАЛИЕВ НИТРАТ,Н НАТРИЕВ СТАНАТ, CI77007

37,5% HP прозрачен гел
30,4% HP смесен гел

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
- Pola Office+ се използва за контролирано, медицински указано възстановяване на естествения цвят на обезцветени витални и невитални зъби, когато не може да бъде възстановен до естествения или нормален цвят за зъба чрез професионално почистване на зъбите.
- Медицинското възстановяване на естествения цвят на зъбите е указано, когато обезцветяване поради патологично развиващ цвят на зъба води до влошаване на качеството на живот на пациента, свързано със здравето.
- Екземпли за такива видове вродени обезцветявания са естествения цвят на зъбите може да се използва и като алтернатива на значително повече инвазивно козметично или нестандартно лечение на засегнатите зъби (пломби, корони, фасети) и следователно винаги трябва да бъде първи избор.
- Примери за причини за такова вътрешно обезцветяване са: Причинено от тетрациклин / миноциклин обезцветяване, лека до тежка зъбна флуороза, невитални зъби (пулпна некроза) - например поради травма, генетично или свързано с възрастта дегенеративно обезцветяване, порфирия или жълтеница, тежки отлагания от хранителни оцветители с проникващо в зъбната материя.

ВАЖНО:
Преди лечението, диагностично потвърдена индикация за „медицинско указано възстановяване на естествения цвят на зъбите", трябва да бъде направена от зъболекар.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не използвайте при бременни или кърмещи жени.
- Да не се използва при деца под 18-годишна възраст.
- Не използвайте гингивалната бариера (SDI Limited) при хора, които получават алергия при контакт със смола / акрил.

Не използвайте Pola Office+ при:
- Да се използва при пациенти с изключително чувствителни зъби

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Възможна е преходна чувствителност на зъбите, само при витални зъби. Уверете се, че пациентът е предупреден преди лечението и предоставете инструкции за грижи след лечението, ако е необходимо.
- Възможно е преходно дразнене на меките тъкани, ако гингивалната бариера не е приложена правилно, за да се предотврати контакт на продукта с меките тъкани.
- Компонентите на SDI гингивалната бариера може, в редки случаи, да причинят сенсибилизация. В теза случаи, гингивалната бариера не трябва да се използва.
- Някои пациенти могат да изпитат подуване на меките тъкани, зачервяване, болезненост. Тези странични ефекти обикновено са временни и е важно пациентите да са информирани за тях, а клиницистите да наблюдават тези потенциални реакции и да ги управляват по подходящ начин с медицински експерт.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Не са известни.
Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте инцидента на производителя на този продукт и на компетентния орган във Вашия щат или държава.

СЪВЕТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЕТА: ВИТАЛЕН ЗЪБ
Препоръки:
1. Изберете подходящ кандидат. Забележка: Не всеки е подходящ за осветляване в кабинета, например пациент с полупрозрачни зъби или от група Vita® C.
2. Пациентът трябва да е в добро общо здравословно състояние.
3. Запечатайте всички открити корени и реставрации.
4. Информирайте пациента, че резултатите не са гарантирани, тъй като премахването на петната варира при различните.
5. Киселинното ецване преди третирането НЕ се препоръчва.
6. Използвайте накрайници с голям диаметър не се препоръчват, тъй като те могат да разнесат гела върху другите области.
7. Лек дискомфорт в зъбите по времето на лечението може да бъде често срещан страничен ефект.
8. Ако пациентът изпитва чувствителност по време на фотополимеризацията, леко накрайника от зъба. Ако това не подейства, отстранете гела и изплакнете засегнатата област. Направете оценка на други възможни причини.
9. Отложете всякакви естетични реставрации в продължение на 2 до 4 седмици след лечението.
10. Посъветвайте пациента да не пушат, да не консумира силно оцветени, горещи или студени ядки или напитки в продължение на поне 2 дни.
11. Третирайте всяка следоперативна чувствителност с десенсибилизиращ гел или паста за зъби.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЦВЕТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: ВИТАЛЕН ЗЪБ
Препоръки:
1. Определете и запишете предоперативен нюанс. Моля, следвайте това ръководство за нюанс на Vita® според степента на яркост: B1►A1►B2►D2►A2►C1►C2►D4►A3►D3►B3►A3.5►B4►C3►A4►C4
2. Изолирайте зъба / зъбите, който / които третираме(т) използвайки гумена преграда използвайки стандартни техники и инструменти. Уверете се, че преградата стена приляга плътно към цервикалния ръб. Забележка: Ако не е използвана гумена преграда, покрийте приблизително половината от съседните витални зъби с 3 - 4 мм дебел слой гингивална бариера (SDI Limited) за изолиране от топлинен дискомфорт от полимеризиращата светлина. Това се правя, когато се третира единичен зъб.
3. Отворете язовирен достъп до пулпната камера и премахнете всички композитни, основни материали и гутаперча 2 - 3 мм апикално спрямо цементно-емайлната връзка. Поставете основа от стъклен йонер / цинков фосфат (Riva Light Cure или Riva Self Cure (SDI Limited)), с дебелина най-малко 1 мм, за да се осигури бариера между „запечатан" канал на корен и осветляващ гел.
4. Поставете гела Pola Office+ в отворената пулпна камера и върху лабиалната повърхност.
5. Оставете гела на/в в продължение на 8 минути (По желание: може да се използва фотополимеризиращ лампа на Radii Cure (SDI Limited)).
6. Изсмукайте гела чрез стандартни техники и инструменти.
7. Повторете стъпки 4 - 6, докато постигнете желания нюанс.
8. След последното приложение, изсмукайте и изплакнете гела, използвайки стандартни техники и инструменти.
9. Отбележете крайния нюанс.

Допълнителни бележки:
Накрайниците на спринцовките за гингивалната бариера са само за еднократна употреба.
Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване между пациентите.

СЪХРАНЕНИЕ И БОРАВЕНЕ:
Съхранявайте продукта в хладилник (2°-8°C / 35°-46°F)
Използвайте продукта при стайна температура.
Не използвайте гингивалната бариера (SDI Limited) при хора, които са алергични към смола/акрилна.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
- Само за професионална употреба.
- Не извеждайте спринцовката от опаковката, докато не е готова да употребя - продукт Pola Office+ е чувствителен към топлина и светлина.
- Съхранявайте на места, недостъпни за деца и домашни любимци.
- Не приемайте вътрешно.
- Не използвайте след изтичане срока на годност.
- Не използвайте, ако фолиото изглежда подуто.
- Спринцовките Pola Office+ може да са под налягане - свалете капачката и поставете дюзата внимателно.
- Пациентът трябва да носи предпазни очила.
- Операторите трябва да носят ръкавици, маска и защитни очила.
- Потвърдително е всеки, който има алергия към химикали да се подложи на тестове за алергия преди лечението.
- Не знестезирайте пациента.
- Не подвеждайте гела Pola Office+ да влиза в контакт с кожата, очите и меките тъкани.

Не използвайте:
- Да се използва Pola Office+ при лица с известни пероксидни алергии.
- Да се използва при пациенти с изключително чувствителни зъби

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Възможна е преходна чувствителност на зъбите, само при витални зъби. Уверете се, че пациентът е предупреден преди лечението и предоставете инструкции за грижи след лечението, ако е необходимо.
- Възможно е преходно дразнене на меките тъкани, ако гингивалната бариера не е приложена правилно, за да се предотврати контакт на продукта с меките тъкани.
- Компонентите на SDI гингивалната бариера може, в редки случаи, да причинят сенсибилизация. В теза случаи, гингивалната бариера не трябва да се използва.
- Някои пациенти могат да изпитат подуване на меките тъкани, зачервяване, болезненост. Тези странични ефекти обикновено са временни и е важно пациентите да са информирани за тях, а клиницистите да наблюдават тези потенциални реакции и да ги управляват по подходящ начин с медицински експерт.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Не са известни.
Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте инцидента на производителя на този продукт и на компетентния орган във Вашия щат или държава.

СЪВЕТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЕТА: НЕВИТАЛЕН ЗЪБ
Препоръки:
1. Изолирайте зъба ефективно, използвайки стандартни техники и инструменти.
2. Защитете устната лигавица, за да предотвратите химическо изгаряния, като използвате стандартни техники и инструменти.
3. Проверете адекватната ендодонтска обтурация.
4. Използвайте защитна бариера съгласно инструкциите на производителя за предотвратяване на достигането на пероксид до пародонталната лигамент.
5. Избягвайте киселинно ецване, тъй като може да се получи дразнене на пародонталните лигаменти.
6. Посъветвайте пациента, че избеленият неживи зъб няма да изглежда по същия начин като витален зъб.
7. Периодично викайте пациентите на преглед на избелените зъби клинично и рентгенографски).

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЯТ: НЕВИТАЛЕН ЗЪБ
Препоръки:
1. Определете и запишете предоперативен нюанс. Моля, следвайте това ръководство за нюанс на Vita® според степента на яркост: B1►A1►B2►D2►A2►C1►C2►D4►A3►D3►B3►A3.5►B4►C3►A4►C4
2. Изолирайте зъба / зъбите, който / които третираме(т) използвайки гумена преграда използвайки стандартни техники и инструменти. Уверете се, че преградата стена приляга плътно към цервикалния ръб. Забележка: Ако не е използвана гумена преграда, покрийте приблизително половината от съседните витални зъби с 3 - 4 мм дебел слой гингивална бариера (SDI Limited) за изолиране от топлинен дискомфорт от полимеризиращата светлина. Това се правя, когато се третира единичен зъб.
3. Отворете язовирен достъп до пулпната камера и премахнете всички композитни, основни материали и гутаперча 2 - 3 мм апикално спрямо цементно-емайлната връзка. Поставете основа от стъклен йонер / цинков фосфат (Riva Light Cure или Riva Self Cure (SDI Limited)), с дебелина най-малко 1 мм, за да се осигури бариера между „запечатан" канал на корен и осветляващ гел.
4. Поставете гела Pola Office+ в отворената пулпна камера и върху лабиалната повърхност.
5. Оставете гела на/в в продължение на 8 минути (По желание: може да се използва фотополимеризиращ лампа на Radii Cure (SDI Limited)).
6. Изсмукайте гела чрез стандартни техники и инструменти.
7. Повторете стъпки 4 - 6, докато постигнете желания нюанс.
8. След последното приложение, изсмукайте и изплакнете гела, използвайки стандартни техники и инструменти.
9. Отбележете крайния нюанс.

Допълнителни бележки:
Накрайниците на спринцовките за гингивалната бариера са само за еднократна употреба.
Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване между пациентите.

СЪХРАНЕНИЕ И БОРАВЕНЕ:
Съхранявайте продукта в хладилник (2°-8°C / 35°-46°F)
Използвайте продукта при стайна температура.
Не използвайте гингивалната бариера (SDI Limited) при хора, които са алергични към смола/акрилна.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
- Само за професионална употреба.
- Не извеждайте спринцовката от опаковката, докато не е готова да употребя - продукт Pola Office+ е чувствителен към топлина и светлина.
- Съхранявайте на места, недостъпни за деца и домашни любимци.
- Не приемайте вътрешно.
- Не използвайте след изтичане срока на годност.
- Не използвайте, ако фолиото изглежда подуто.
- Спринцовките Pola Office+ може да са под налягане - свалете капачката и поставете дюзата внимателно.
- Пациентът трябва да носи предпазни очила.
- Операторите трябва да носят ръкавици, маска и защитни очила.
- Потвърдително е всеки, който има алергия към химикали да се подложи на тестове за алергия преди лечението.
- Не знестезирайте пациента.
- Не подвеждайте гела Pola Office+ да влиза в контакт с кожата, очите и меките тъкани.

Не използвайте:
- Да се използва Pola Office+ при лица с известни пероксидни алергии.
- Да се използва при пациенти с изключително чувствителни зъби.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Възможна е преходна чувствителност на зъбите, само при витални зъби. Уверете се, че пациентът е предупреден преди лечението и предоставете инструкции за грижи след лечението, ако е необходимо.
- Възможно е преходно дразнене на меките тъкани, ако гингивалната бариера не е приложена правилно, за да се предотврати контакт на продукта с меките тъкани.
- Компонентите на SDI гингивалната бариера може, в редки случаи, да причинят сенсибилизация. В теза случаи, гингивалната бариера не трябва да се използва.
- Някои пациенти могат да изпитат подуване на меките тъкани, зачервяване, болезненост. Тези странични ефекти обикновено са временни и е важно пациентите да са информирани за тях, а клиницистите да наблюдават тези потенциални реакции и да ги управляват по подходящ начин с медицински експерт.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Не са известни.
Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте инцидента на производителя на този продукт и на компетентния орган във Вашия щат или държава.

Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Информационният лист за безопасност (SDS) е наличен на www.sdi.com.au или се свържете с Вашия регионален представител

Vita скалата за цветове е търговска марка на VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Германия

ОПАКОВКА:
Комплект за 3 пациента
3 x 2.8mL спринцовки Pola Office+
3 x 1g спринцовки за гингивална бариера

Комплект за 1 пациент
1 x 2.8mL спринцовки Pola Office+
1 x 1g спринцовка за гингивална бариера

CES NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Pola Office+ slouží k obnově přirozené barvy zubů u přirozeně zabarvených živých i mrtvých zubů. Tento postup smí provádět pouze zubní lékař v kontrolovaném prostředí, a to z důvodu obtížnosti přístupu a omezené spolupráce pacienta.
Pola Office+ je systém pro obnovení barvy zubů v ordinaci na bázi peroxidu vodíku, který vyžaduje minimální čas strávený v křesle.
Jde o gel s neutrálním pH který obsahuje dusičnan draselný pro maximální pohodlí pacienta. System dvojité injekční stříkačky mísí gel tak, aby jej bylo možné snadno a přesně aplikovat přímo na ošetřovanou oblast zubu.

SLOŽENÍ:
VODA, PEROXID VODÍKU, PVP, HYDROXID SODNÝ, KYSELINA ETIDRONOVÁ, DUSIČNAN DRASELNÝ, STANNAN SODNÝ, CI77007

37,5% HP čirý gel
30,4 % HP smíchaný gel

INDIKACE K POUŽITÍ
- Pola Office+ se používá k řízené, lékařsky indikované obnově přirozené barvy zubů zdravých, živých i mrtvých zubů, které nelze obnovit do přirozené nebo normální barvy zubů profesionálním čištěním zubů.
- Lékařské obnovení přirozené barvy zubů je indikováno v případě, že zabarvení způsobené patologicky odlišnou barvou zubů vede ke zhoršení kvality života pacienta z hlediska zdraví.
Lékařské obnovení přirozené barvy zubů lze také použít jako alternativu k výrazně invazivnějším kosmetickým nebo profylaktickým ošetřením postižených zubů (výplně, korunky, fazety) a proto by mělo být vždy první volbou.
- Příklady příčin takových vnitřní zabarvení jsou:
  - Tetracyclin/minocycline změna barvy, mírná až těžká zubní fluoróza, mrtvé zuby (nekróza pulpy) - např. v důsledku úrazu, genetické nebo věkem podmíněné degenerativní změny barvy, porfyrie nebo žloutenky, silných usazenin potravinářských barviv, které pronikly do zubní hmoty (vnitřní zabarvení způsobené vnějšími barvivy).
- Lze jej použít k obnovení přirozené barvy zubů u jednotlivých nebo více zubů a endodonticky ošetřených, mrtvých zubů, včetně intrakoronálního ošetření

DŮLEŽITÉ:
Před ošetřením musí zubní lékař diagnostiky potvrdit indikaci lékařsky indikované obnovení přirozené barvy zubu".

KONTRAINDIKACE:
1. Nepoužívejte přípravek u těhotných nebo kojících žen.
2. Nepoužívejte u dětí mladších 18 let.
3. Gingivální bariéru (SDI Limited) nepoužívejte u osob se známou alergií na pryskyřici/akrylát.

Nepoužívejte Pola Office+:
- u osob se známou alergií na peroxidy.
- Nepoužívejte u pacientů s extrémně citlivými zuby.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
- Možná přechodná citlivost zubů, pouze u živých zubů. Před ošetřením je nutné pacienta informovat a v případě potřeby mu poskytněte pokyny pro péči po ošetření.
- Při nesprávném použití gingivální bariéry, která zabraňuje kontaktu produktu s měkkými tkáněmi, může dojít k přechodnému podráždění měkkých tkání.
- Složky gingivální bariéry SDI mohou ve výjimečných případech způsobit senzibilizaci. V těchto případech by gingivální bariéra neměla používat.
- U některých pacientů se může objevit otok měkkých tkání, zarudnutí a citlivost. Tyto nežádoucí účinky jsou obecně dočasné a je důležité, aby si ich pacienti byli vědomi a aby je lékaři sledovali a v případě výskytu vhodně řešili ve spolupráci s lékařským odborníkem.

INTERAKCE:
Žádné známé.
Pokud došlo k závažnému incidentu v souvislosti s tímto výrobkem, nahlaste jej výrobci tohoto výrobku a příslušnému orgánu ve vašem státě nebo zemi.

TIPY PRO OBNOVENÍ BARVY: ŽIVÝ ZUB
1. Vyberte vhodného kandidáta. Poznámka: Ne každý je vhodný pro bělení v ordinaci, např. Pacienti s průsvitnými zuby skupiny Vita® C.
2. Pacient musí být v dobrém celkovém zdravotním stavu.
3. Utěsněte všechny odkryté kořeny a výplně.
4. Informujte pacienta, že výsledky nejsou zaručené, protože odstranění skvrn se u jednotlivých pacientů liší.
5. Před ošetřením se NEDOPORUČUJE leptání kyselinou.
6. Široké špičky s velkým průměrem se nedoporučují, protože mohou gel rozdělit do jiných oblastí.
7. Běžným vedlejším účinkem může být mírná citlivost zubů během ošetření.
8. Pokud pacient pociťuje citlivost během světelného vytvrzování, přesuňte špičku mírně od zubu. Pokud to nepomůže, gel odstraňte a postižené místo opláchněte. Zhodnoťte další možné příčiny.
9. Estetické opravy odložte na 2 až 4 týdny po ošetření.
10. Pacientovi doporučte, aby alespoň 2 dny nekouřil a nekonzumoval silně barvené, horké nebo studené pokrmy a nápoje.
11. Jakoukoli pooperační citlivost ošetřete desenzibilizačním gelem nebo zubní pastou.

POKYNY PRO OBNOVENÍ BARVY: ŽIVÝ ZUB
Doporučení:
1. Určete a zaznamenejte odstín před zákrokem. Postupujte podle tohoto průvodce odstínu Vita®shade podle stupně jasu:
B1►A1►B2►D2►A2►C1►C2►D4►A3►D3►B3►A3.5►B4►C3►A4►C4
2. Zuby čistěte POUZE pericnou na bázi gelu a standardních technik a nástrojů.
3. Umístěte kofer retraktory a poté odkryté povrchy rtů pokryjte vazelinovým gelem.
4. Zuby osušte a na oba obličeje nanestie gingivální bariéru (SDI Limited) tak, aby mírně překrývala sklovinu a mezizubní prostory.
5. Světlem vytvrzujte pohybem ve tvaru vějíře po dobu 10–20 sekund, dokud není gingivální bariéra (SDI Limited) vytvrzená.
6. Pevné přopojte stříkačku s injekční stříkačce Pola Office+ směrem od pacienta. Nanestie malé množství gelu na michkací podložku, odkud nevytvrdne nanesené množství gelu.
7. Pomocí tyčky jako pomůcky nanestie tenkou vrstvu gelu přímo na všechny zuby, které mají být ošetřeny. Tenká vrstva zabrání stékání gelu. POZNÁMKA: Při přechodu od zubu k zubu je nalepší tyčku nevedat. Tryskou pohybujte plynule.
8. Gel nechte působit 8 minut (Volitelné: V této fázi lze použít vytvrzovací lampu Radii Xper nebo Radii Plus (SDI Limited)).
Ošetřujete-li zuby vnitřního a vnějšího povrchu, lze použít 2 vytvrzovací lampy (jednu na každé straně) k aktivaci přípravku Pola Office+.
9. Gel odsajte pomocí standardních technik a nástrojů.
10. Opakujte kroky 4–6, dokud nedosáhnete požadovaného odstínu.
11. Po poslední aplikaci odsajte a smyjte gel pomocí standardních technik a nástrojů.
12. Zaznamenejte konečný odstín.

Další poznámky:
- Hroty injekčních stříkaček s gingivální bariérou jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití povede ke křížové kontaminaci pacientů.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE
- Produkt skladujte v chladničce (2°–8°C / 35°–46°F)
- Produkt používejte při pokojové teplotě. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Všechny nepoužité stříkačky musí být uchovávány v lékařským odborníkem.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
- Pouze k profesionálnímu použití.
- Stříkačku nevyjímejte z obalu, dokud není připravena k použití - Pola Office+ je citlivý na teplo a světlo.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Nepoužívejte, pokud se fólie jeví jako nafoukla.
- Stříkačky Pola Office+ mohou být pod tlakem – sejměte víčko a opatrně nasaďte dýzu.
- Pacient musí nosit nasazeny ochranné brýle.
- Obsluha musí mít nasazeny rukavice, masku a ochranné brýle.
- Kdokoliv, kdo má v anamnéze alergie na chemikálie, by měl doporučuje před ošetřením podstoupit alergické testy.
- Pacienta NEANESTEZUJTE.
- Zabraňte kontaktu gelu Pola Office+ s pokožkou, očima a měkkými tkáněmi.
- Pokud použijete jinou značku gingivální bariéry nebo kofer, nár misfarvning pá grund av det specifikke tandfarve fører til en forkortet levetid af produktet.
- Ujistěte se, že jste dodrželi všechny pokyny výrobce, aby se zaručil sundhedsrelaterede livskvalitet hos patienten.
- Medicinská natrhutí tandfarve genetablering er kaldet en ændring af det oprindelige tandfarve fører til en forkortet levetid af professionel tandrensning.
- Medicinsk natrhutí tandfarve etablering er indikeret, når misfarvning på grund af en patologisk afvigende tandfarve fører til en forringelse af den sundhedsrelaterede livskvalitet hos patienten.
- Medicinsk natrhutí tandfarve genetablering kan også bruges som et alternativ til betydeligt mere invasivt kosmetisk eller profetisk behandlinger af de berørte tænder (fyldninger, kroner, facader) og der derfor altid være foretrukket.

**ADVARSLER

EFFETTI COLLATERALI:

- Possibile sensibilità dentale transitoria, solo per denti vitali. Il paziente deve essere avvisato preventivamente e istruito sulla gestione post-trattamento.
- Possibile irritazione transitoria dei tessuti molli se la barriera gengivale non è applicata correttamente, con conseguente contatto del prodotto con le mucose.
- I componenti di SDI Gingival Barrier possono, in rari casi, causare sensibilizzazione. In tali casi la barriera gengivale non deve essere utilizzata.
- Alcuni pazienti possono manifestare gonfiore, arrossamento o dolorabilità dei tessuti molli. Tali effetti indesiderati sono generalmente temporanei: è importante che i pazienti ne siano informati e che il clinico monitori eventuali reazioni, gestendole in collaborazione con un medico se necessario.

INTERAZIONI:

Nessuna nota.
In caso di incidente grave legato a questo prodotto, segnalare l'evento al produttore e all'autorità competente del proprio Stato o Paese.

CONSIGLI PER LO SBIANCAMENTO: DENTE NON VITALE

Raccomandazioni:

1. Isolare il dente in modo efficace utilizzando tecniche e strumenti standard.
2. Proteggere la mucosa orale per prevenire ustioni chimiche, utilizzando tecniche e strumenti standard.
3. Verificare l'adeguata otturazione canalare endodontica.
4. Utilizzare una barriera protettiva, secondo le istruzioni del produttore, per evitare che il perossido raggiunga il legamento parodontale.
5. Evitare la monderazione acida, poiché può causare irritazione del legamento parodontale.
6. Informare il paziente che un dente non vitale sbiancato non apparirà identico a un dente vitale.
7. Richiamare periodicamente i pazienti per controlli clinici e radiografici dei denti sbiancati.

ISTRUZIONI PER LO SBIANCAMENTO - DENTE NON VITALE

Raccomandazioni:

1. Determinare e registrare la tonalità pre-operatoria. - Seguire questa sequenza della scala Vita* in base al grado di brillantezza: B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
2. Pulire i denti utilizzando solo pomice a base di fanno con le tecniche e gli strumenti standard.
3. Posizionare i divaricatori per guance e/oppure la superficie dalle labbra esposte con cuscinetti.
4. Asciugare i denti e applicare una barriera gengivale (Gingival Barrier SDI Limited) su entrambe le arcate, sovrapponendo leggermente lo smalto e gli spazi interprossimali.
5. Fotopolimerizzare con movimento a ventaglio per 10-20 secondi fino a completa eliminazione della barriera Gingival Barrier (SDI Limited).
6. Fissare saldamente un beccuccio misceladore alla siringa di Pola Office+ lontano dal paziente. Erogare una piccola quantità di gel su un pad da miscelazione fino a ottenere un gel uniforme.
7. Utilizzando il beccuccio come guida, applicare direttamente un settile sopra il gel su tutti i denti oggetto del trattamento. Uno strato sottile aiuta a prevenire la diffusione del gel.
   Nota: è preferibile non sollevare il beccuccio quando si passa da un dente all'altro. Procedere eseguendo un movimento continuo.
8. Lasciare il gel in sede per 8 minuti (Opzionale: può essere utilizzata una lampada fotopolimerizzante, Radii Xpert o Radii Plus (SDI Limited).
9. Rimuovere il gel con aspiratore chirurgico seguendo le istruzioni del produttore.
   Nota: è normale che rimanga uno strato residuo di gel sulla superficie dei denti.
10. Ripetere i passaggi 7–9 fino a un massimo di 4 volte.
11. Dopo l'ultima applicazione, aspirare tutto il gel, quindi lavare e aspirare nuovamente.
12. Rimuovere la barriera Gingival Barrier (SDI Limited) sollevandola da un'estremità.
13. Registrare la tonalità finale.

CONSIGLI PER LO SBIANCAMENTO: DENTE NON VITALE

Raccomandazioni:

1. Isolare il dente in modo efficace utilizzando tecniche e strumenti standard.
2. Proteggere la mucosa orale per prevenire ustioni chimiche, utilizzando tecniche e strumenti standard.
3. Verificare l'adeguata otturazione canalare endodontica.
4. Utilizzare una barriera protettiva, secondo le istruzioni del produttore, per evitare che il perossido raggiunga il legamento parodontale.
5. Evitare la monderazione acida, poiché può causare irritazione del legamento parodontale.
6. Informare il paziente che un dente non vitale sbiancato non apparirà identico a un dente vitale.
7. Richiamare periodicamente i pazienti per controlli clinici e radiografici dei denti sbiancati.

ISTRUZIONI PER LO SBIANCAMENTO - DENTE NON VITALE

Raccomandazioni:

1. Determinare e registrare la tonalità pre-operatoria. - Seguire questa sequenza della scala Vita* in base al grado di brillantezza:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
2. Pulire i denti utilizzando solo pomice a base di fanno con le tecniche e gli strumenti standard.
3. Posizionare i divaricatori per guance e/oppure la superficie dalle labbra esposte con cuscinetti.
4. Asciugare i denti e applicare una barriera gengivale (Gingival Barrier SDI Limited) su entrambe le arcate, sovrapponendo leggermente lo smalto e gli spazi interprossimali.
5. Fotopolimerizzare con movimento a ventaglio per 10-20 secondi fino a completa eliminazione della barriera Gingival Barrier (SDI Limited).
6. Fissare saldamente un beccuccio misceladore alla siringa di Pola Office+ lontano dal paziente. Erogare una piccola quantità di gel su un pad da miscelazione fino a ottenere un gel uniforme.
7. Utilizzando il beccuccio come guida, applicare direttamente un settile sopra il gel su tutti i denti oggetto del trattamento. Uno strato sottile aiuta a prevenire la diffusione del gel.
   Nota: è preferibile non sollevare il beccuccio quando si passa da un dente all'altro. Procedere eseguendo un movimento continuo.
8. Lasciare il gel in sede per 8 minuti (Opzionale: può essere utilizzata una lampada fotopolimerizzante, Radii Xpert o Radii Plus (SDI Limited).
9. Rimuovere il gel con aspiratore chirurgico seguendo le istruzioni del produttore.
   Nota: è normale che rimanga uno strato residuo di gel sulla superficie dei denti.
10. Ripetere i passaggi 7–9 fino a un massimo di 4 volte.
11. Dopo l'ultima applicazione, aspirare tutto il gel, quindi lavare e aspirare nuovamente.
12. Rimuovere la barriera Gingival Barrier (SDI Limited) sollevandola da un'estremità.
13. Registrare la tonalità finale.

KOR 사용 설명서

CONSIGLI PER LO SBIANCAMENTO: DENTE NON VITALE

Raccomandazioni:

1. Isolare il dente in modo efficace utilizzando tecniche e strumenti standard.
2. Proteggere la mucosa orale per prevenire ustioni chimiche, utilizzando tecniche e strumenti standard.
3. Verificare l'adeguata otturazione canalare endodontica.
4. Utilizzare una barriera protettiva, secondo le istruzioni del produttore, per evitare che il perossido raggiunga il legamento parodontale.
5. Evitare la monderazione acida, poiché può causare irritazione del legamento parodontale.
6. Informare il paziente che un dente non vitale sbiancato non apparirà identico a un dente vitale.
7. Richiamare periodicamente i pazienti per controlli clinici e radiografici dei denti sbiancati.

ISTRUZIONI PER LO SBIANCAMENTO: DENTE NON VITALE

Raccomandazioni:

1. Determinare e registrare la tonalità pre-operatoria. - Seguire questa sequenza della scala Vita* in base al grado di brillantezza:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
2. Pulire i denti utilizzando solo pomice a base di fanno con le tecniche e gli strumenti standard.
3. Posizionare i divaricatori per guance e/oppure la superficie dalle labbra esposte con cuscinetti.
4. Asciugare i denti e applicare una barriera gengivale (Gingival Barrier SDI Limited) su entrambe le arcate, sovrapponendo leggermente lo smalto e gli spazi interprossimali.
5. Fotopolimerizzare con movimento a ventaglio per 10-20 secondi fino a completa eliminazione della barriera Gingival Barrier (SDI Limited).
6. Fissare saldamente un beccuccio misceladore alla siringa di Pola Office+ lontano dal paziente. Erogare una piccola quantità di gel su un pad da miscelazione fino a ottenere un gel uniforme.
7. Utilizzando il beccuccio come guida, applicare direttamente un settile sopra il gel su tutti i denti oggetto del trattamento. Uno strato sottile aiuta a prevenire la diffusione del gel.
   Nota: è preferibile non sollevare il beccuccio quando si passa da un dente all'altro. Procedere eseguendo un movimento continuo.
8. Lasciare il gel in sede per 8 minuti (Opzionale: può essere utilizzata una lampada fotopolimerizzante, Radii Xpert o Radii Plus (SDI Limited).
9. Rimuovere il gel con aspiratore chirurgico seguendo le istruzioni del produttore.
   Nota: è normale che rimanga uno strato residuo di gel sulla superficie dei denti.
10. Ripetere i passaggi 7–9 fino a un massimo di 4 volte.
11. Dopo l'ultima applicazione, aspirare tutto il gel, quindi lavare e aspirare nuovamente.
12. Rimuovere la barriera Gingival Barrier (SDI Limited) sollevandola da un'estremità.
13. Registrare la tonalità finale.

LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PRECAUZIONI

- Unicamente per uso professionale.
- Non rimuovere la siringa dall'involucro fino al momento dell'uso – Pola Office+ è sensibile al calore e alla luce.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non ingerire.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare se il foglio di alluminio appare rigonfio.
- Le siringhe di Pola Office+ possono essere sotto pressione: rimuovere il tappo e fissare il beccuccio con cautela.
- Il paziente deve indossare occhiali protettivi.
   Gli operatori devono indossare guanti, mascherina e occhiali protettivi.
   Chiunque abbia una storia di allergie chimiche è invitato a sottoporsi a test di sensibilità prima del trattamento.
- NON anestetizzare il paziente.
- Non permettere che il gel Pola Office+ venga a contatto con pelle, occhi e tessuti molli.
- Se si utilizza una barriera gengivale in una clinica in resina diversa da quella prodotta da SDI, accertarsi di seguire tutte le precauzioni indicate dal produttore.

PRIMO SOCCORSO:

Occhi (contatto): aprire bene l'occhio e lavare accuratamente per 15 minuti con acqua corrente. Consultare un medico.
Pelle (contatto): lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Applicare una miscela di bicarbonato di sodio e acqua sull'area interessata. Consultare un medico se si sintomi persistono.
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Fare gargarismi con acqua salata e bere abbondante latte. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Conservazione e manipolazione

- Conservare il prodotto in frigorifero (2-8 °C / 35-46 °F)
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Le eventuali siringhe non utilizzate dovranno essere riposte in frigorifero.

PRECAUZIONI

- Unicamente per uso professionale.
- Non rimuovere la siringa dall'involucro fino al momento dell'uso – Pola Office+ è sensibile al calore e alla luce.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non ingerire.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare se il foglio di alluminio appare rigonfio.
- Le siringhe di Pola Office+ possono essere sotto pressione: rimuovere il tappo e fissare il beccuccio con cautela.
- Il paziente deve indossare occhiali protettivi.
   Gli operatori devono indossare guanti, mascherina e occhiali protettivi.
   Chiunque abbia una storia di allergie chimiche è invitato a sottoporsi a test di sensibilità prima del trattamento.
- NON anestetizzare il paziente.
- Non permettere che il gel Pola Office+ venga a contatto con pelle, occhi e tessuti molli.
- Se si utilizza una barriera gengivale in una clinica in resina diversa da quella prodotta da SDI, accertarsi di seguire tutte le precauzioni indicate dal produttore.

PRIMO SOCCORSO:

Occhi (contatto): aprire bene l'occhio e lavare accuratamente per 15 minuti con acqua corrente. Consultare un medico.
Pelle (contatto): lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Applicare una miscela di bicarbonato di sodio e acqua sull'area interessata. Consultare un medico se i sintomi persistono.
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Fare gargarismi con acqua salata e bere abbondante latte. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Conservazione e manipolazione

- Conservare il prodotto in frigorifero (2-8 °C / 35-46 °F)
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Le eventuali siringhe non utilizzate dovranno essere riposte in frigorifero.

기타 약물과의 상호 작용:

일반적인 치과 약물과의 상호작용은 확인되고 있지 않다. 광중합 램프를 사용하는 경우, 해당 사건을 제품 수명 동안 기록할 것을 권장하는 지역의 관할 당국에 보고해 주십시오.

부작용:

생활지의 경우, 일시적 치아 민감증이 있을 수 있습니다. 치료 전 환자에게 사전 경고를 하고, 필요한 경우 사후 관리 지침을 안내합니다.
치료 방법이에 따라 오염되어 본 제품이 연조직에 접촉할 경우, 일시적인 연조직 자극이 발생할 수 있습니다.
SDI 진치형 베리어의 구성 성분은 드물지만 민감 증상을 유발할 수 있습니다. 이러한 증상이 발생하는 경우, 진치형 베리어를 사용해서는 안 됩니다.
일부 환자의 경우 연조직의 부종, 발적, 압통이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 부작용은 일반적으로 일시적이지만 이러한 사실을 들어놓을지 않는 것이 중요합니다. 노출을 매치 않고 연속으로 이용하여 사용하십시오.

미백 요령: 생활지

1. 적합한 환자를 선택하십시오. 참고: 고농도 과산화 치료를 받는 사람에 적합하지는 않습니다(예: 치아가 반투명한 경우 또는 Vita* 그룹에 속하는 환자).
2. 치아 상태를 검사하기 전반적으로 양호해야 합니다.
3. 노출된 치아 및 수복물을 모두 밀봉합니다.
4. 열록 제거의 경우는 환자마다 결과가 다를 수 있다는 점을 알립니다.
5. 시술 전 산부식 처리는 권장되지 않습니다.
6. 적절한 크기의 홈입 팁 사용 시 젤이 한 부위로 과잉 주입이 있으므로 권장되지 않습니다.
   시술 도중 치아에 남아있는 경미한 불균형은 본인 부자용임 수 있습니다.
7. 광중합기 사용 도중 참고기 시간 동안을 경험하는 경우 팁 부분을 자이에서 조금 멀리 이동합니다. 효과가 없는 경우, 젤을 제거하고 다시 시도하십시오. 부위를 충분히 채웠다면, 젤 경과는 다른 방식을 권장합니다.
   참고: 본 팁 부자용임 수 있습니다.
8. 과산화물이 치근막에 닿지 않도록 조심하십시오. 과산화물이 치아 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
9. 치근막에 과산화물이 닿는 경우 치료를 즉시 중단하십시오.
10. 최소 2일 동안은 환자가 음연을 삼가고, 색소가 강하거나 또감거나 기름진 음식을 섭취하지 않도록 권고합니다.
11. 시술 후 시럽 중상이 나타나는 경우에는 일반적인 젤 또는 치약을 사용하십시오.

식품에 대한 지침 복원: 생활지

권고 사항:

1. 시술 전 현재 치아 색상을 확인하고 기록합니다. 치아 밝기 정도에 따른 본 Vita* 음영 가이드 배열을 사용해 주십시오.
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
2. 치아 및 주변 조직을 보호합니다. 본 제품은 연조직에 접촉할 수 있습니다.
3. 기구가 닿지 않도록 주의하십시오. 수술용 가위 및 기구가 닿지 않도록 주의하십시오.
4. 치아 표면에 젤이 남아있는 것은 정상입니다.
5. 국도의 민감성 치아를 가진 환자에게는 사용하지 마십시오.

부작용:

생활지의 경우, 일시적 치아 민감증이 있을 수 있습니다. 치료 전 환자에게 사전 경고를 하고, 필요한 경우 사후 관리 지침을 안내합니다.
치료 방법이에 따라 오염되어 본 제품이 연조직에 접촉할 경우, 일시적인 연조직 자극이 발생할 수 있습니다.
SDI 진치형 베리어의 구성 성분은 드물지만 민감 증상을 유발할 수 있습니다. 이러한 증상이 발생하는 경우, 진치형 베리어를 사용해서는 안 됩니다.
일부 환자의 경우 연조직의 부종, 발적, 압통이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 부작용은 일반적으로 일시적이지만 이러한 사실을 들어놓을지 않는 것이 중요합니다. 노출을 매치 않고 연속으로 이용하여 사용하십시오.
8. 8분 동안 현 상태로 방치합니다. (선택 사항: 본 단계에서 Radii 엑스레 또는 Radii 플러스(SDI Limited)를 사용할 수 있습니다.)
9. 제조업체 지침에 따라 수술용 흡인기 장치를 사용하여 젤을 흡입하여 제거합니다.
   참고: 치아 표면에 젤이 남아있는 것은 정상입니다.
10. 7~9단계를 최대 4번까지 반복합니다.
11. 마지막 도포 후에는 젤을 모두 흡인한 후, 세척하고 흡인합니다.
12. 진치형 베리어(SDI Limited) 한 쪽 끝을 들어올려 제거합니다.
13. 최종 색상을 기록합니다.

SLK NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRECAUZIONI

- Unicamente per uso professionale.
- Non rimuovere la siringa dall'involucro fino al momento dell'uso – Pola Office+ è sensibile al calore e alla luce.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non ingerire.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare se il foglio di alluminio appare rigonfio.
- Le siringhe di Pola Office+ possono essere sotto pressione: rimuovere il tappo e fissare il beccuccio con cautela.
- Il paziente deve indossare occhiali protettivi.
   Gli operatori devono indossare guanti, mascherina e occhiali protettivi.
   Chiunque abbia una storia di allergie chimiche è invitato a sottoporsi a test di sensibilità prima del trattamento.
- NON anestetizzare il paziente.
- Non permettere che il gel Pola Office+ venga a contatto con pelle, occhi e tessuti molli.
- Se si utilizza una barriera gengivale in una clinica in resina diversa da quella prodotta da SDI, accertarsi di seguire tutte le precauzioni indicate dal produttore.

PRIMO SOCCORSO:

Occhi (contatto): aprire bene l'occhio e lavare accuratamente per 15 minuti con acqua corrente. Consultare un medico.
Pelle (contatto): lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Applicare una miscela di bicarbonato di sodio e acqua sull'area interessata. Consultare un medico se i sintomi persistono.
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Fare gargarismi con acqua salata e bere abbondante latte. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Conservazione e manipolazione

- Conservare il prodotto in frigorifero (2-8 °C / 35-46 °F)
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Le eventuali siringhe non utilizzate dovranno essere riposte in frigorifero.

미백 요령: 생활지

1. 적합한 환자를 선택하십시오. 참고: 고농도 과산화 치료를 받는 사람에 적합하지는 않습니다(예: 치아가 반투명한 경우 또는 Vita* 그룹에 속하는 환자).
2. 치아 상태를 검사하기 전반적으로 양호해야 합니다.
3. 노출된 치아 및 수복물을 모두 밀봉합니다.
4. 열록 제거의 경우는 환자마다 결과가 다를 수 있다는 점을 알립니다.
5. 시술 전 산부식 처리는 권장되지 않습니다.
6. 적절한 크기의 홈입 팁 사용 시 젤이 한 부위로 과잉 주입이 있으므로 권장되지 않습니다.
   시술 도중 치아에 남아있는 경미한 불균형은 본인 부자용임 수 있습니다.
7. 광중합기 사용 도중 참고기 시간 동안을 경험하는 경우 팁 부분을 자이에서 조금 멀리 이동합니다. 효과가 없는 경우, 젤을 제거하고 다시 시도하십시오. 부위를 충분히 채웠다면, 젤 경과는 다른 방식을 권장합니다.
   참고: 본 팁 부자용임 수 있습니다.
8. 과산화물이 치근막에 닿지 않도록 조심하십시오. 과산화물이 치아 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
9. 치근막에 과산화물이 닿는 경우 치료를 즉시 중단하십시오.
10. 최소 2일 동안은 환자가 음연을 삼가고, 색소가 강하거나 또감거나 기름진 음식을 섭취하지 않도록 권고합니다.
11. 시술 후 시럽 중상이 나타나는 경우에는 일반적인 젤 또는 치약을 사용하십시오.

식품에 대한 지침 복원: 생활지

권고 사항:

1. 시술 전 현재 치아 색상을 확인하고 기록합니다. 치아 밝기 정도에 따른 본 Vita* 음영 가이드 배열을 사용해 주십시오.
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
2. 치아 및 주변 조직을 보호합니다. 본 제품은 연조직에 접촉할 수 있습니다.
3. 기구가 닿지 않도록 주의하십시오. 수술용 가위 및 기구가 닿지 않도록 주의하십시오.
4. 치아 표면에 젤이 남아있는 것은 정상입니다.
5. 국도의 민감성 치아를 가진 환자에게는 사용하지 마십시오.

용금 처치

눈에 들어갔을 경우: 눈을 크게 뜨고 15분 동안 흐르는 물에 깨끗이 씻어내십시오. 의사와 상담하십시오.
피부에 닿았을 경우: 즉시 물로 씻어 씻습니다. 한 한수소나트륨과 물을 섞어 피부에 바르십시오. 증상이 계속되면 의사와 상담하십시오.
삼켰을 경우: 물로 입안을 헹굽니다. 소금물로 가글한 후, 다량의 우유를 마십니다. 증상이 지속되면 의사와 상담하십시오.
흡입하는 경우: 정상적인 사용 조건에서 증상은 없는 것으로 예상됩니다. 증상이 나타나는 경우, 환기가 잘 되는 장소로 이동합니다. 본 제품은 인한 심각한 사고가 발생하는 경우, 해당 사건을 제품 제조업체 및 귀하의 거주국 또는 지역의 관할 당국에 보고해 주십시오.

SDS는 www.sdi.com.au에서 확인하거나 지역 대리점에 문의하십시오.

*Vita 등록 이미지는 VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germany의 등록 상표입니다.

내용물:

3회의 진치용
2.8ml. 플라 오피스+ 주사기 3개
1g 지온 보호제 주사기 3개
한자 1인용 키트
2.8ml. 플라 오피스+ 주사기 1개
1g 지온 보호제 주사기 1개

RON INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pola Office+ este concept pentru a restaura culoarea naturală a dinților vitali și devitalizați de pretonă și decolorați intrinseci. Această procedură trebuie efectuată doar de un profesionist stomatologic, într-un cabinet dentar, din cauza dificultăților legate de acces și a limitărilor în ceea ce privește conformarea pacientului.
Pola Office+ este un sistem de restaurare a culorii dinților bazată de peroxid de hidrogen, care necesită o intervenție minimă. Este un gel cu pH neutru și conține nitrat de potasiu pentru a maximiza confortul pacientului. Sistemul cu seringă dublă amestecă gelul activ și conține o pipetă de aplicat direct, ușor și precis pe zona dinților care trebuie tratată.

COMPOZIȚIE:

APA, PEROXID DE HIDROGEN, PVP, HIPOXID DE SODIU, ACID ETIDRONIC, NITRAT DE POTASIU, STANAT DE SODIU, CI77007

Gel transparent HP 37,5%
Gel mixt HP 30,4%

INDICAȚII DE UTILIZARE:

1. Pola Office+ este utilizat pentru restaurarea controlată, pe baza unei indicații medicale, a culorii naturale a dinților vitali și devitalizați decolorați, care nu poate fi restaurată la o culoare naturală sau normală a dinților printr-o curățare profesională a dinților.
   - Restaurarea medicală a culorii naturale a dinților vitali și devitalizați atunci când decolorarea, cauzată de culoarea cu deviație patologică a dinților, duce la deteriorare a calității vieții pacientului în ceea ce privește sănătatea.
   - Restaurarea medicală a culorii naturale a dinților poate fi folosită și ca alternativă la tratamentele conservatoare sau prostetice, mai invazive: aplicare dințișor efectuat (plombe, coronițe, fațete) și, prin urmare, ar trebui să fie întotdeauna prima opțiune.
   - Exemple de cauze ale unor astfel de decolorări intrinseci: Decolorare cauzată de tetraciclină/minociclină, fluoroză (tentată uzual până la severă, dinți devitalizați (necroză pulpară) - de exemplu, din cauza unor traume, decolorare degenerativă de cauză genetică sau legată de vârstă, dentite sau citer, depunerii mari de coloranți alimentari cu penetrarea substanței dintelui (decolorare intrinsecă, care este cauzată de coloranți extrinseci).
   - Poate fi folosit pentru a ajuta la restaurarea culorii naturale a dinților individuali sau multipli și a dinților devitalizați, cu tratament endodontic, inclusiv tratament intraoronar

IMPORTANT:

Înainte de tratament, dentistul trebuie să emită o indicație confirmată pe bază de diagnostic pentru „restaurarea de indicație medicală a culorii naturale a dinților".

CONTRAINDICATII:

1. Nu se utilizează în cazul femeilor însărcinate sau al femeilor care alăptează.
2. A nu se utiliza în cazul copiilor cu vârsta sub 18 ani.
3. Nu utilizați barierа gingivală (SDI Limited) în cazul persoanelor cu alergii cunoscute la contactul cu rășini/acrilic.
4. Nu utilizați Pola Office+ în cazul persoanelor cu alergii cunoscute la peroxid.
5. A nu se utiliza în cazul pacienților cu dinți extrem de sensibili.

EFECTE SECUNDARE:

- Posibilă sensibilitate dentară tranzitorie, doar pentru dinții vitali. Asigurați-vă că pacientul este avertizat înainte de tratament și furnizați instrucțiuni pentru îngrijirea post-tratament, dacă este necesar.
- Posibilă iritație tranzitorie la nivelul țesuturilor moale în cazul în care bariera gingivală nu este aplicată corect pentru a preveni contactul dintre produs și țesuturi moale.
   Componentele barierei gingivale SDI ar putea provoca, în rare ocazii, o sensibilizare. În astfel de cazuri, bariera gingivală nu trebuie folosită.
- Unii pacienți pot prezenta umflarea țesuturilor moi, roșeață, sensibilitate. În general, aceste efecte secundare sunt temporare și este important ca pacienții să le cunoască și ca medicii să monitorizeze aceste reacții potențiale și să le gestioneze corespunzător în cazul în care este cazul.

INTERACȚIUNI:

Nu se cunosc.
Dacă a avut loc un incident grav din cauza acestui produs, vă rugăm să raportați producătorului acestui produs și autorității competente din statul sau țara dumneavoastră.

SFATURI PENTRU RESTAURAREA CULORII DINTE VITAL

1. Selectați candidatul potrivit.
   Notă: Nu folosiți niciodată peste urma tratamentul de înălbire în cabinet, de exemplu, un pacient cu dinți tratați/cu albire la urma „Vita" C+.
2. Pacientul trebuie să aibă o stare generală bună de sănătate.
3. Igilați toate rădăcinile și restaurările expuse.
4. Informați pacientul că rezultatele nu sunt garantate deoarece îndepărtarea peliculei variază de la pacient la pacient.
5. Gravarea acidă înainte de tratament NU este recomandată.
6. Vârfurile de aspirație cu diametru mare nu se recomandă deoarece instrumentele pardon. Certifique-se de que o dique se ajusta firmemente no colo cervical.
   Nota: se não for possível obter um usor disconfort în timpul tratamentului.
8. Dacă pacientul prezintă sensibilitate în timpul fotopolimerizării, îndepărtați gelul usor fără de dinți. Dacă acest lucru nu dă rezultate, îndepărtați gelul și câștiți zona afectată. Evaluați alte căuțe posibile.
9. Amânați orice restaurare estetică timp de 2 săptămâni de la tratament.
10. Stăluți pacientul să nu frunzese, să nu consume alimente sau băuturi puternic colorate, fierbinți sau reci timp de cel puțin 2 zile.
11. Trata pe orice pacient cu sensibilitate postoperatorie cu un gel desensibilizant sau pastă de dinți.

INSTRUCTIUNI PENTRU RESTAURAREA CULORII: DINTE VITAL

Recomandări:

1. Stabiliți și consemnați nuanța preoperatorie. Este recomandat ca în cazul în care se folosește o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
2. Curățați dinții folosind numai pastă de profilaxie și instrumente standard.
3. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
4. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
5. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
6. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
7. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
8. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
9. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
   B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
10. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
11. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
12. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
13. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
14. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
15. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
16. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
17. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
18. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
19. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
20. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
21. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
22. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
23. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
24. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
25. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
26. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
27. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
28. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
29. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
30. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
31. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
32. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
33. Izolați dinții și consemnați nuanța preoperatorie. Folosiți o scală Vita* a culorii dinților de pe grupul de strălucire:
    B1+A1+B2+D2+A2+C1+C2+D4+A3 +D3+B3+A3.5+B4+C3+A4+C4
34. Izolați dinții și consemnați nuan